

## 8 - Cardiopatia da Mulher e na Gestaçã

Miocardiopatia periparto: Um relato de casot

MARCELO ANTUNES VIEIRA, LÍVIA RODRIGUES LACERDA, MARCO ANTONIO TEIXEIRA, RODOLPHO POEYS LIMA, JESSICA MARQUES FITARONI, MAURÍCIO RODRIGUES LACERDA.

Hospital São José do Avaí Itaperuna RJ BRASIL.

**INTRODUÇÃO:** Miocardiopatia periparto é uma causa rara de ICC, acometendo mulheres no final da gestação e puerpério, tendo etiologia desconhecida, sem história de cardiopatia prévia. O diagnóstico é clínico, confirmado com ecocardiograma. **MATERIAL E MÉTODOS:** Relato de caso. **RESULTADOS:**JNA, sexo feminino, 30 anos, melanodérmica internada no Hospital São José do Avaí, RJ, com queixa de dispnéia aos esforços evoluindo com ortopnéia e dispnéia paroxística noturna, associado a tosse seca e palpitação iniciado há 15 dias da admissão. Nega DM, HAS e outras cardiopatias prévias. Nega tabagismo e outras comorbidades. Ao exame físico de alterado:RCR em 3T (B3) ,sopro sistólico em foco mitral, estertores bibasais com murmúrio diminuído em bases, turgência jugular. Foi iniciada a investigação através de exames complementares: RX de tórax(aumento da área cardíaca e congestão peri-hilar),ECG(alterações inespecíficas da repolarização,extra sístole ventricular ) prosseguindo a propedêutica através de Ecocardiograma(V. mitral afastada do septo c/ ponto , miocardiopatia dilatada c/ importante disfunção sistólica global do VE e c/ importante disfunção diastólica). **CONCLUSÃO:** A importância do caso descrito, está em um diagnóstico etiológico mais precoce, já que, dessa forma o tratamento iniciado tão logo, interfere de forma significativa no prognóstico,sendo que a disfunção de VE persistente em 50% das pacientes com mortalidade de 85% em 5 anos .